

# Fiche info patient

## ÉCHOGRAPHIE DE STRESS (TEST À L'EFFORT ou À LA DOBUTAMINE)

### POURQUOI VOUS PROPOSE-T-ON UNE ÉCHOGRAPHIE DE STRESS ?

Le ventricule gauche (une des 4 cavités du cœur) se contracte pour propulser le sang oxygéné (qui vient des poumons) dans l'aorte et « nourrir » les différents organes. Pour fonctionner correctement, le ventricule gauche reçoit lui-même du sang oxygéné grâce à des artères, les artères coronaires. Si une ou plusieurs de ces artères sont rétrécies (présence de plaques d'athéromes), le sang passe plus difficilement. Cela peut toutefois suffire à assurer le bon fonctionnement du ventricule gauche au repos, mais lorsque la demande devient importante (quand on fait un effort par exemple), elle n'est plus assurée correctement par la ou les coronaires malades et la contraction du ventricule gauche devient alors anormale.

L'échographie de stress est un examen utilisé pour étudier la contraction du ventricule gauche, soit au cours d'un effort, soit sous perfusion d'un médicament visant à reproduire les conditions de l'effort. La machine utilisée est un appareil d'échographie. Comme pour une échographie transthoracique de repos, on utilise un capteur ultrasonore (encore appelé sonde ou transducteur) qui est posé sur votre thorax, et qui émet et reçoit des ultrasons, à la manière d'un sonar utilisé par les navigateurs. La particularité de l'examen tient à l'enregistrement de la contraction du ventricule gauche pour différentes fréquences cardiaques (au cours de l'examen, le cœur est de plus en plus rapide).

L'objectif est de mettre en évidence le territoire du ventricule gauche insuffisamment irrigué par une artère coronaire, dont le calibre est rétréci par l'athérosclérose.

# Fiche info patient

## ÉCHOGRAPHIE DE STRESS (TEST À L'EFFORT ou À LA DOBUTAMINE)

### RÉALISATION DE L'ÉCHOGRAPHIE DE STRESS

#### La préparation

Vous pouvez manger et boire normalement ; les médicaments qui sont autorisés avant la réalisation de l'examen vous seront précisés par votre cardiologue. Le point important porte sur la prise des médicaments – prescrits habituellement – pour prévenir la survenue de douleur d'angine de poitrine. Les traitements qui ralentissent le cœur tel que les bêtabloquants (Ténormin, Selozok, Inderal, Kredex, Isoten, Emconcor, Bisoprolol, Atenolol...) ainsi que certains anticalciques (Tildiem, Isoptine, Diltiazem...) sont à stopper 48h avant l'examen.

Aucun sédatif n'est nécessaire. Vous serez éveillé pendant l'examen afin de préciser la survenue éventuelle d'une sensation inhabituelle ou reproduite (palpitations, douleur d'angine de poitrine, essoufflement...). Dans tous les cas, une perfusion est mise en place, visant à injecter le médicament qui reproduit les conditions d'un effort (Dobutamine) ou à administrer éventuellement d'autres drogues.

#### Le lieu de l'examen

Dans le laboratoire d'échocardiographie, dans une salle équipée pour effectuer d'éventuels gestes de réanimation, précaution indispensable lorsque votre médecin suspecte la présence d'un rétrécissement du calibre des artères du cœur.

#### La durée de l'examen

L'examen dure 30 à 45min, sauf cas particulier.

# Fiche info patient

## ÉCHOGRAPHIE DE STRESS (TEST À L'EFFORT ou À LA DOBUTAMINE)

### Les modalités de l'examen

À votre arrivée, quelques questions vous seront posées concernant votre identité, vos symptômes récents, les antécédents cardiovasculaires. La survenue récente d'une douleur dans la poitrine ou d'une arythmie cardiaque doit être signalée. Après mise en place de la perfusion, des électrodes seront placées sur votre thorax et sur vos bras afin de surveiller de façon continue votre rythme cardiaque grâce à un électrocardiogramme. Votre position habituelle, lors de l'examen, est couchée sur le côté gauche, que vous choisirez la plus confortable possible.

Il est normal que pendant l'examen vous ressentiez des palpitations, qui correspondent à l'accélération du rythme cardiaque induit par l'effort physique ou la perfusion du médicament. Il est également possible que vous ressentiez une sensation de souffle court, qu'il faudra alors signaler au médecin ou à l'infirmier. La survenue d'un autre symptôme, quel qu'il soit, en particulier une douleur d'angine de poitrine qui vous rappelle celle pour laquelle vous avez été adressé, doit immédiatement être signalée afin qu'un traitement spécifique vous soit administré.

À la fin de l'examen, vous devez garder la position de l'examen pendant quelques minutes, afin que le médecin puisse surveiller l'électrocardiogramme et la fonction du muscle cardiaque, après l'arrêt de la perfusion du médicament. Il est fréquent qu'un médicament « antidote » soit injecté à la fin de l'examen, afin de restaurer au plus vite un rythme cardiaque normal. Après l'examen aucun symptôme ne doit être présent à la fin de la perfusion. Dans le cas où une arythmie cardiaque (palpitations) ou une douleur d'angine de poitrine serait survenue pendant l'examen, un traitement spécifique vous aura été administré faisant disparaître le symptôme en quelques secondes ou minutes.

La perfusion est rapidement ôtée, et vous pouvez rejoindre votre domicile ou votre lit d'hospitalisation, après qu'un électrocardiogramme aura été enregistré afin de vérifier le retour au tracé de base.

Cet examen est important pour la prise en charge de votre maladie.

→ **N'hésitez pas lors de votre arrivée au laboratoire à demander des informations complémentaires, soit à l'infirmier qui vous accueillera, spécialisé pour ce type d'examen, soit au médecin qui réalisera l'examen.**

# Fiche info patient

## ÉCHOGRAPHIE DE STRESS (TEST À L'EFFORT ou À LA DOBUTAMINE)

### L'ÉCHOGRAPHIE DE STRESS COMPORTE-T-ELLE DES RISQUES ?

Des incidents bénins peuvent survenir, tels que palpitations ou douleur thoracique cessant rapidement par arrêt de l'examen ou injection de médicament.

Des incidents plus sérieux surviennent rarement : dans environ 0,5% des cas lors d'échographie d'effort ; dans 1 à 2% des cas lors de perfusion de médicament pour simuler l'effort ; il s'agit surtout de problèmes de douleurs prolongées dans la poitrine ou de troubles du rythme cardiaque nécessitant rarement une intervention urgente (ce qui explique la présence du matériel de réanimation).

L'un des produits parfois administrés est contre-indiqué en cas de glaucome ou des problèmes de prostate. Signalez-le si tel est le cas.

### QUELS BÉNÉFICES PEUT-ON ATTENDRE DE L'ÉCHOGRAPHIE DE STRESS ?

Cet examen, qui reproduit les conditions de survenue d'une douleur d'angine de poitrine, permet de localiser de façon précise le territoire du muscle cardiaque insuffisamment irrigué. Il permet aussi de mettre en évidence un territoire du muscle ne fonctionnant pas normalement à l'état de repos, mais qui pourrait s'améliorer, grâce à une intervention thérapeutique spécifique.

Ce territoire présente de fait une « réserve » qui permet de prédire la normalisation de la fonction du muscle cardiaque, après que l'artère qui l'irrigue aura bénéficié d'un traitement spécifique (médicament, dilatation par ballonnet, pontage).

# Consentement éclairé

## ÉCHOGRAPHIE DE STRESS (TEST À L'EFFORT ou À LA DOBUTAMINE)

Identification patient

Je soussigné(e), M/Mme\* .....

né(e) le ..... / ..... / ..... certifie :

→ **Que Dr/M/Mme\* .....  
m'a informé(e) par un langage clair :**

- De la nature du geste qui m'est proposé ;
- De mon droit de refuser cet examen.

→ **Avoir eu la possibilité de poser toutes les questions  
concernant cet examen et y avoir obtenu une réponse  
complète et satisfaisante. J'ai bien compris les réponses qui  
m'ont été données.**

→ **Donner mon consentement pour que soit réalisé cet examen.**

En conclusion, je comprends le sens et les explications du document que je signe ci-dessous. Tout est parfaitement clair et j'affirme en faire mon affaire personnelle.

Si le patient est incapable d'exercer ses droits :

Nom de la personne qui exerce les droits en tant que mandataire/  
représentant/ administrateur de la personne tel que désigné par le juge de  
paix du patient incapable : .....

Par la présente, cette personne certifie avoir effectué toutes les  
démarches légales en ce sens.

Fait à ....., le ..... / ..... / .....

Signature du patient, et, si patient incapable, également la signature de  
son représentant légal/mandataire/administrateur de la personne tel que  
désigné par le juge de paix\* (précédée de la mention « lu et approuvé »).

(\*Biffer les notions inutiles)

Signature de la personne qui procure l'information

Document à signer par les deux parties, puis scanné ([GED-MO-00109](#)) dans le dossier médical informatisé « Care » dans la spécialité « droits du patient -catégorie consentements -sous-catégorie consentement » + copie à fournir au patient sur demande.

